

Erstfunde von Flechten und lichenicolen Pilzen in Deutschland

Matthias SCHULTZ, Volkmar WIRTH & Tassilo FEUERER

Zusammenfassung: SCHULTZ, M., WIRTH, V. & FEUERER, T. 2007. Erstfunde von Flechten und lichenicolen Pilzen in Deutschland. – *Herzogia* 20: 329–334.

Die Flechtenparasiten *Arborillus llimonae* und *Asterophoma mazaediicola* sowie die Flechten *Buellia violaceofusca*, *Caloplaca fuscoatra*, *Lempholemma condensatum*, *Metamelanea caesiella*, *Pycnora leucococca*, *Pyrenocarpon flotowianum*, *Pyrenopsis conferta*, *Rinodina furfurea* und *Xanthoparmelia plittii* werden erstmals für Deutschland nachgewiesen. Auf die aus Deutschland beschriebene, aber seither nicht beachtete *Xanthoparmelia angustiphylla* wird aufmerksam gemacht.

Abstract: SCHULTZ, M., WIRTH, V. & FEUERER, T. 2007. Records of lichens and lichenicolous fungi new to Germany. – *Herzogia* 20: 329–334.

The lichenicolous fungi *Arborillus llimonae* and *Asterophoma mazaediicola* and the lichens *Buellia violaceofusca*, *Caloplaca fuscoatra*, *Lempholemma condensatum*, *Metamelanea caesiella*, *Pycnora leucococca*, *Pyrenocarpon flotowianum*, *Pyrenopsis conferta*, *Rinodina furfurea* and *Xanthoparmelia plittii* are recorded for Germany for the first time. Attention is drawn to *Xanthoparmelia angustiphylla*, a neglected species originally described from Germany.

Key words: Lichens, lichenicolous fungi, Germany, new records.