

Wiederfund von *Lobaria virens* in Deutschland

Eberhard FISCHER & Dorothee KILLMANN

Zusammenfassung: FISCHER, E. & KILLMANN, D. 2008. Wiederfund von *Lobaria virens* in Deutschland. – *Herzogia* **21**: 79–84.

Lobaria virens konnte nach über 100 Jahren in Deutschland wiedergefunden werden. Das Vorkommen an der Lahn in Rheinland-Pfalz umfasst 46 Thalli auf vertikalen bemoosten Felsen mit einer Fläche von etwa 2,2 m². Die ehemalige Verbreitung der Art in Deutschland wird diskutiert und ihre Vergesellschaftung am neu entdeckten Fundort beschrieben. Als Einstufung für *L. virens* in der Roten Liste der gefährdeten Flechten in Deutschland wird die Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ vorgeschlagen.

Abstract: FISCHER, E. & KILLMANN, D. 2008. Rediscovery of *Lobaria virens* in Germany. – *Herzogia* **21**: 79–84.

Lobaria virens was rediscovered in Germany after more than 100 years. The locality in the Lahn valley in Rhineland-Palatinate consists of 46 thalli covering a surface of about 2.2 m² on vertical mossy rock. The former distribution of the species in Germany is discussed and its sociology at the newly discovered locality is described. A proposal is made to change the category for *L. virens* in the German Red List of threatened lichens to critically endangered.

Key words: Lobarion, rediscovery, sociology, habitat continuity, Red List.